



HEPCLUDEX®

Bulevirtid 2mg


Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung

عربي

Arabisch

دليل الحقن

AT-HPX-0075; 09/2023



Gilead Sciences GesmbH
Wagramer Straße 19
1220 Wien



GILEAD

Creating Possible




سيوضح الطبيب أو الممرضة كيفية تحضير هيبكلوديس® وحقنه قبل البدء بالعلاج باستخدام هذا الدواء في المنزل. يوضح هذا الدليل كيفية حقن نفسك باستخدام هذا الدواء. تحدث مع الطبيب أو الممرض إذا لم تكن متأكدًا من شيء، أو كان لديك أسئلة، أو إذا كنت تحتاج إلى مزيد من المعلومات أو المساعدة. خصص وقتًا كافيًا لتحضير هيبكلوديس® وحقنه بحرص.

هذا الدليل مخصص للمرضى الذين تم وصف دواء هيبكلوديس لهم. لا يهدف هذا الدليل إلى استبدال نشرة معلومات المريض، ولكنه مادة إضافية للمساعدة في حقن الدواء بأمان. الرجاء قراءة نشرة/حزمة معلومات الخاصة بالمريض بدقة.

مكان الحقن

يمكنك تغيير موقع حقن هيبكلوديس® بانتظام من أجل تقليل الآثار الجانبية في مكان الحقن.

لا يحقن هيبكلوديس® في المناطق التالية: الركبة، أو الفخذ، أو الأرداف من الناحية السفلى أو الداخلية، أو مباشرة فوق الأوعية الدموية، أو حول السرة، أو على الأنسجة المتندبة، أو الكدمات، أو الشامات، أو الندبات الجراحية، أو الوشم أو مكان الحرق، أو حيث يوجد رد فعل لموقع الحقن.




د (1)

تنظيف القارورة

امسح الجزء العلوي من القارورة باستخدام ضمادة كحول جديدة، واترك الجزء العلوي يجف في الهواء.

إذا لمست الجزء المطاطي بعد تنظيفه، فقم بتنظيفه مرة أخرى باستخدام ضمادة كحول جديدة.




ج (1)

غسل اليدين

اغسل يديك جيدًا باستخدام الصابون والماء الدافئ، وجففهما بمنشفة نظيفة.


بعد تنظيف يديك، لا تلمس أي شيء آخر غير الدواء والمستلزمات والمنطقة المحيطة بمكان الحقن.



ب (1)

تحضير الجرعات


التعليمات التالية للحصول على محلول جرعة واحدة.



أ (1)

التخزين

يجب تخزين قوارير هيبكلوديس® في العبوة الأصلية في الثلاجة (2-8 درجة مئوية) لحماية هيبكلوديس® من الضوء.




ج (2)

مزج هيكلوديس® برفق

اضغط برفق على قنينة هيكلوديس® بأطراف أصابعك لمدة 10 ثوانٍ لبدء إذابة البودرة. قم بلف قنينة هيكلوديس® برفق بين يديك من أجل التأكد من المزج الجيد. تأكد من عدم وجود مسحوق هيكلوديس® عالقاً في جدار القارورة.

ملاحظة هامة! لا تهز قنينة هيكلوديس®. يسبب الاهتزاز حدوث رغوة في الدواء وسيستغرق الذوبان وقتاً أطول.



ب (2)

وضع الماء المعقم في المسحوق بالحقن


اضغط برفق على قنينة هيكلوديس® لتليين البودرة. أدخل إبرة الماء المعقم في قارورة هيكلوديس® بزاوية. احقن الماء المعقم ببطء، حتى ينزل الماء بالتقطيع إلى أسفل جانب القارورة في بودة هيكلوديس®.



أ (2)

سحب الماء المعقم


أمسك الحقنة. ضع الإبرة الطويلة.
ملاحظة هامة! تأكد من أن الإبرة المغطاء مثبتة بدفعها لأسفل قليلاً أثناء لفها في اتجاه عقارب الساعة. اسحب الغطاء البلاستيكي. افتح الماء المعقم للحقن. أدخل الإبرة في القارورة وقم بقلب القارورة بلطف.



د (2)

تنظيف القارورة

امسح الجزء العلوي من قارورة هيكلوديس® باستخدام ضمادة كحول جديدة. واترك الجزء العلوي يجف في الهواء.




هـ (2)

جاهزية هيكلوديس® للحقن

إذا رأيت فقاعات، انقر برفق على القارورة حتى تختفي. إذا رأيت جزيئات في محلول هيكلوديس® بمجرد إذابته (تماماً)، فلا تستخدم هذه القارورة. اتصل بالطبيب أو الصيدلي الذي قدمها.

يجب استخدام بوليفيرتيد المُعاد تركيبه على الفور.



د (2)

فحص هيكلوديس®


بمجرد أن يبدأ المسحوق في الذوبان، ضعه جانباً وسيذوب تماماً.

يمكن أن يستغرق الذوبان ما يصل إلى 3 دقائق بعد النقر.

يجب أن يكون محلول هيكلوديس® صافياً عند الانتهاء من المزج.

ملاحظة هامة! يجب أن يكون هيكلوديس® المذاب تماماً صافياً ودون رغوة.

إذا ظهر محلول هيكلوديس® رغوياً أو مصفراً، اتركه لمزيد من الوقت ليذوب.




د (3)

تغيير الإبرة والتخلص منها

أخرج الإبرة الطويلة من الحقنة، وتخلص منها بشكل صحيح حتى لا يصاب أحد.

ملاحظة هامة! لا تضع الغطاء البلاستيكي على الإبرة مرة أخرى.




ج (3)

انتهاء التحضير

اضغط أو انقر برفق على الحقنة وادفع/اسحب المكبس لإزالة الهواء والفقاغات الزائدة.

تحتاج إلى سحب المكبس بعد علامة 1.0 مل للتأكد من أن ينتهي بك الأمر بالحصول على 1.0 مل من هيبكلوديس® في الحقنة. قم بإزالة الإبرة والمحقة بحرص من القارورة.




ب (3)

سحب هيبكلوديس®

اقلب القارورة بلطف. تأكد من أن يكون طرف الإبرة دائماً تحت سطح محلول هيبكلوديس® لمنع دخول فقاعات الهواء في الحقنة.

اسحب المكبس ببطء للحصول على 1.0 مل من هيبكلوديس®.




أ (3)

إدخال الإبرة في القارورة

النقط الحقنة.

أدخل الإبرة في قارورة سائل هيبكلوديس®.




ح (3)

حقن هيبكلوديس

اخترق الجلد بزواوية 45 درجة. يجب إدخال الإبرة في الداخل.

ادفع المكبس ببطء حتى يتم حقن هيبكلوديس®. أزل الإبرة من الجلد.


أخرج الإبرة الطويلة من الحقنة وتخلص منها بشكل صحيح حتى لا يصاب أحد بأذى.



ز (3)

تحضير موقع الحقن

امسك واضغط على طية من الجلد حول مكان الحقن.




و (3)

اختيار موقع الحقن

اختر موقعاً مختلفاً عن الموقع الذي استخدمته في المرة السابقة للحقن. نظف مكان الحقن بضمادة كحول جديدة. ابدأ في المنتصف واضغط ونظف بحركة دائرية من المركز وصولاً إلى النقاط الأبعد.

ملاحظة هامة! اترك الموقع يجف في الهواء.



هـ (3)

وضع الإبرة للحقن

ضع الإبرة الأفصر على الحقنة.

ملاحظة هامة! تأكد من أن الإبرة المغطاة مشدودة بدفعها لأسفل قليلاً أثناء لفها في اتجاه عقارب الساعة.

اسحب الغطاء البلاستيكي.