



HEPCLUDEX®


Bulevirtid 2mg

Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung



Injektionsanleitung

AT-HPX-0064, Juli 2023



		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

 2-8 °C



GILEAD

Creating Possible

Schritt-für-Schritt-Injektionsanleitung

Diese Injektionsanleitung ist für Patientinnen und Patienten gedacht, welche bereits HEPCLUDEX® verordnet bekommen haben. Sie ersetzt nicht die Gebrauchsinformation, sondern soll Ihnen helfen, sich das Medikament täglich sicher verabreichen zu können. Bitte lesen Sie sich immer zusätzlich die Gebrauchsinformation/Packungsbeilage sorgfältig durch.

Bevor Sie die Behandlung mit diesem Arzneimittel zu Hause beginnen, wird Ihr Arzt oder das medizinische Fachpersonal


Ihnen zeigen, wie HEPCLUDEX® vorzubereiten und zu injizieren ist. In dieser Anleitung wird gezeigt, wie Sie sich das Arzneimittel selbst injizieren. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder dem medizinischen Fachpersonal, wenn Ihnen etwas unklar ist, wenn Sie Fragen haben oder wenn Sie weitere Informationen oder Hilfe benötigen. Nehmen Sie sich Zeit, um HEPCLUDEX® sorgfältig vorzubereiten und zu injizieren.

Injektionsstellen



Um Reaktionen an der Injektionsstelle zu reduzieren, können Sie die Stelle der HEPCLUDEX®-Injektion regelmäßig wechseln.

In folgende Bereiche darf HEPCLUDEX® **nicht injiziert werden**: Knie, Leistengegend, untere oder innere Gesäßbacken, direkt über einem Blutgefäß, im Bereich um den Bauchnabel herum, in Narbengewebe, in einen blauen Fleck, in einen Leberfleck, in eine operative Narbe, in ein Tattoo oder eine verbrannte Hautstelle oder überall dort, wo bereits eine Injektionsstellen-Reaktion vorliegt.

Bauch




Oberschenkel




1A Aufbewahrung

HEPCLUDEX®-Durchstechflaschen müssen in der Originalverpackung im Kühlschrank (2°C bis 8°C) aufbewahrt werden, um HEPCLUDEX® vor Licht zu schützen.



1B Dosen vorbereiten


Die folgenden Anweisungen gelten für das Auflösen einer Einzeldosis.



1C Hände waschen

Waschen Sie Ihre Hände gründlich mit Seife und warmem Wasser und trocknen Sie sie mit einem sauberen Handtuch ab.


Sobald Ihre Hände sauber sind, berühren Sie keine anderen Gegenstände als das Arzneimittel, die Zubehörmaterialien und den Bereich um die Injektionsstelle herum.



1D Oberseite der Durchstechflasche reinigen

Wischen Sie die Oberseite der Durchstechflasche mit einem frischen Alkoholtupfer ab und lassen Sie sie an der Luft trocknen.

Wenn Sie die Oberseite des Gummistopfens nach der Reinigung berühren, reinigen Sie sie erneut mit einem frischen Alkoholtupfer.



2A Steriles Wasser aufziehen

Nehmen Sie die Spritze zur Hand. Bringen Sie die längere Nadel an.


Wichtig! Stellen Sie sicher, dass die mit der Schutzkappe versehene Nadel fest sitzt, indem Sie sie leicht nach unten drücken und im Uhrzeigersinn drehen.

Ziehen Sie die Kunststoff-Schutzkappe ab.

Öffnen Sie das sterile Wasser für Injektionszwecke. Führen Sie die Nadel in die Durchstechflasche ein und drehen

Sie die Wasser-Durchstechflasche vorsichtig auf den Kopf. Achten Sie darauf, dass sich die Spitze der Nadel stets unter der Wasseroberfläche befindet, um zu verhindern, dass Luftblasen in die Spritze eindringen.

Ziehen Sie den Spritzenkolben langsam zurück, um 1,0 ml steriles Wasser in die Spritze aufzuziehen. Ziehen Sie die Spritze mit der Nadel vorsichtig aus der Durchstechflasche.




2B Steriles Wasser in das Pulver injizieren

Klopfen Sie vorsichtig gegen die HEPCLUDEX®-Durchstechflasche, um das Pulver aufzulockern.

Führen Sie die Nadel der Spritze mit dem sterilen Wasser angewinkelt in die HEPCLUDEX®-Durchstechflasche ein.


Injizieren Sie das sterile Wasser langsam ein, sodass es an der Wand der Durchstechflasche in das HEPCLUDEX®-Pulver heruntertropfen kann.



2C HEPCLUDEX® vorsichtig mischen

Klopfen Sie 10 Sekunden lang vorsichtig gegen die HEPCLUDEX®-Durchstechflasche, um die Auflösung des Pulvers in Gang zu setzen. Rollen Sie die HEPCLUDEX®-Durchstechflasche anschließend langsam zwischen Ihren Händen, um sicherzustellen, dass der Inhalt gründlich durchgemischt wird. Vergewissern Sie sich, dass kein HEPCLUDEX®-Pulver an der Wand der Durchstechflasche anhaftet.


Wichtig! Schütteln Sie die HEPCLUDEX®-Durchstechflasche nicht. Wenn Sie sie schütteln, bildet das Arzneimittel Schaum und es dauert deutlich länger, bis das Arzneimittel aufgelöst ist.



2D HEPCLUDEX® überprüfen

Sobald das Pulver beginnt sich aufzulösen, stellen Sie es einfach beiseite; es wird sich vollständig auflösen.

Nach dem Schnippen gegen die Flasche kann das Auflösen bis zu 3 Minuten dauern.



2E HEPCLUDEX® bereit für die Injektion

Nach dem vollständigen Durchmischen sollte die HEPCLUDEX®-Lösung klar sein.

Wichtig! Das vollständig aufgelöste HEPCLUDEX® sollte klar sein und keinen Schaum aufweisen.

Wenn die HEPCLUDEX®-Lösung schaumig oder gelblich aussieht, warten Sie etwas länger, bis sich das Pulver vollständig aufgelöst hat.

Wenn Sie Blasen sehen, klopfen Sie vorsichtig gegen

die Durchstechflasche, bis die Blasen verschwinden.


Wenn Sie Partikel in der HEPCLUDEX®-Lösung sehen, nachdem das Pulver (vollständig) aufgelöst ist, verwenden Sie die betreffende Durchstechflasche nicht. Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder an den Apotheker, von dem Sie sie erhalten haben.


Rekonstituiertes Bulevirtid muss unverzüglich angewendet werden.

2F Durchstechflasche reinigen

Reinigen Sie die Oberseite der Durchstechflasche erneut mit einem frischen Alkoholtupfer.

Lassen Sie sie an der Luft trocknen.






3A Nadel in Durchstechflasche einführen

Nehmen Sie die Spritze zur Hand.


Führen Sie die Nadel in die Durchstechflasche mit flüssigem HEPCLUDEX® ein.



3B HEPCLUDEX® aufziehen


Drehen Sie die Durchstechflasche vorsichtig auf den Kopf. Achten Sie darauf, dass sich die Spitze der Nadel stets unter der Oberfläche der HEPCLUDEX®-Lösung befindet, um zu verhindern, dass Luftblasen in die Spritze eindringen.

Ziehen Sie den Spritzenkolben langsam zurück, um 1,0 ml HEPCLUDEX® aufzuziehen.



3C Vorbereitung abschließen


Klopfen oder schnippen Sie vorsichtig gegen die Spritze und drücken Sie den Kolben hinunter bzw. ziehen Sie ihn zurück, um überschüssige Luft und Blasen zu entfernen. Um sicherzustellen, dass sich letztlich 1,0 ml HEPCLUDEX® in der Spritze befinden, müssen Sie unter Umständen den Spritzenkolben bis hinter die 1,0 ml-Markierung zurückziehen. Ziehen Sie die Spritze mit der Nadel vorsichtig aus der Durchstechflasche.



3D Nadel wechseln und alte Nadel entsorgen

Entfernen Sie die längere Nadel von der Spritze und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß in den mitgelieferten Nadelcontainer, sodass sich niemand verletzen kann.

Wichtig! Setzen Sie die Kunststoff-Schutzkappe nicht wieder auf.




3E Nadel für Injektion anbringen

Bringen Sie die kürzere Nadel an der Spritze an.

Wichtig! Stellen Sie sicher, dass die mit der Schutzkappe versehene Nadel fest sitzt, indem Sie sie leicht nach unten drücken und im Uhrzeigersinn drehen.


Ziehen Sie die Kunststoff-Schutzkappe ab.



3F Injektionsstelle wählen


Wählen Sie eine andere Injektionsstelle als die, die Sie bei der letzten Injektion verwendet haben. Reinigen Sie die Injektionsstelle mit einem frischen Alkoholtupfer. Beginnen Sie in der Mitte, üben Sie Druck aus und reinigen Sie mit einer kreisförmigen Bewegung von innen nach außen.

Wichtig! Lassen Sie die Injektionsstelle an der Luft trocknen.



3G Injektionsstelle vorbereiten

Drücken Sie die Haut um die Injektionsstelle herum zu einer Hautfalte zusammen und halten Sie die Falte in dieser Position fest.



3H HEPCLUDEX® injizieren

Stechen Sie die Nadel in einem 45-Grad-Winkel in die Haut. Die Nadel muss fast ganz eingeführt werden.

Drücken Sie den Spritzenkolben vollständig hinunter, um HEPCLUDEX® zu injizieren.

Ziehen Sie die Nadel aus der Haut heraus.

Entfernen Sie die Nadel von der Spritze und entsorgen Sie Nadel und Spritze ordnungsgemäß in den mitgelieferten Nadelcontainer, sodass sich niemand verletzen kann (siehe 3D).