



HEPCLUDEX®

Bulevirtid 2mg


Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung



Polnisch

Instrukcja wstrzykiwania

AT-HPX-0077; 09/2023



Gilead Sciences GesmbH
Wagramer Straße 19
1220 Wien



GILEAD

Creating Possible

Szczegółowa instrukcja podawania wstrzyknięcia

Dana instrukcja wstrzykiwania przeznaczona jest dla pacjentów, którym już przepisano HEPCLUDEX®. Nie ma ona na celu zastąpienia ulotki informacyjnej dla pacjenta, ale jest dodatkowym materiałem, który pomoże bezpiecznie wstrzykiwać lek każdego dnia. Należy zawsze dokładnie przeczytać ulotkę informacyjną dla pacjenta / ulotkę dołączoną do opakowania.


Zanim pacjent rozpocznie samodzielne podawanie leku w warunkach domowych, lekarz lub pielęgniarka pokażą, jak należy przygotowywać i wstrzykiwać lek HEPCLUDEX®. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki, jak samodzielnie wstrzykiwać lek. W razie wątpliwości, pytań lub potrzeby uzyskania bardziej szczegółowych informacji bądź pomocy należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki. Lek HEPCLUDEX® należy przygotowywać i wstrzykiwać bez pośpiechu i uważnie.

Miejsca wstrzyknięcia



W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa reakcji w miejscu wstrzyknięcia, można regularnie zmieniać miejsca wstrzyknięcia HEPCLUDEX®.

Nie wolno wstrzykiwać HEPCLUDEX® w następujące miejsca: kolano, pachwina, dolna lub wewnętrzna część pośladka, bezpośrednio nad naczyniem krwionośnym, okolica pępka, tkanka bliznowata, siniak, pieprzyk, blizna pooperacyjna, tatuaż lub miejsce po oparzeniu ani tam gdzie pojawia się reakcja w miejscu wstrzyknięcia.

Brzuch




Górne partie uda



1A

Przechowywanie


Fiolki HEPCLUDEX® należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w lodówce (2°C – 8°C) w celu ochrony przed światłem.



1B

Przygotowywanie dawek

Poniższe instrukcje dotyczą rozpuszczania pojedynczej dawki.




1C

Mycie rąk

Należy starannie umyć ręce ciepłą wodą z mydłem i osuszyć je czystym ręcznikiem.

Po umyciu rąk **nie należy** dotykać niczego poza lekiem, akcesoriami i okolicą miejsca wstrzyknięcia.




1D

Przetarcie korka fiolki

Przetrzeć korek fiolki nowym wacikiem nasączonym alkoholem i pozostawić do wyschnięcia.

W przypadku dotknięcia gumowego korka po przetarciu należy go wyczyścić jeszcze raz nowym wacikiem.



2A

Pobieranie jałowej wody

Wziąć do ręki strzykawkę. Na strzykawkę nałożyć dłuższą igłę.

Uwaga! Należy upewnić się, że igła jest dobrze zamocowana, lekko dociskając i jednocześnie obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.


Zdjąć plastikową osłonkę. Otworzyć wodę jałową do wstrzykiwań. Wprowadzić do niej igłę i delikatnie

obrócić fiolkę z wodą do góry dnem.

Upewnić się, że końcówka igły cały czas znajduje się pod powierzchnią wody, aby do strzykawki nie dostały się pęcherzyki powietrza.

Powoli odciągnąć tłok, aby pobrać do strzykawki 1,0 ml jałowej wody.

Ostrożnie wyjąć igłę i strzykawkę z fiolki.




2B

Wstrzykiwanie jałowej wody do proszku

Delikatnie postukać w ściankę fiolki z HEPCLUDEX®, aby rozluźnić proszek.

Wprowadzić igłę strzykawki z jałową wodą pod kątem do fiolki z HEPCLUDEX®.

Powoli wstrzykiwać jałową wodę, tak aby spływała po ściance fiolki do proszku zawierającego HEPCLUDEX®.




2C

Delikatne mieszanie HEPCLUDEX®

Koniuszkiem palca delikatnie stukać w fiolkę z HEPCLUDEX® przez 10 sekund, aby proszek zaczął się rozpuszczać. Następnie delikatnie potoczyć fiolkę z HEPCLUDEX® między dłońmi, aby dobrze wymieszać lek. Upewnić się, że żadne pozostałości proszku nie przyległy do ścianki fiolki.

Uwaga! Nie potrząsać fiolką z HEPCLUDEX®. Potrząsanie spieni roztwór i znacznie spowolni proces rozpuszczania leku.




2D

Ogledziny HEPCLUDEX®

Kiedy proszek zacznie się rozpuszczać, wystarczy odstawić fiolkę i pozwolić mu rozpuścić się całkowicie.

Po postukaniu w ściankę proces rozpuszczania może potrwać do 3 minut.



2E

HEPCLUDEX® gotowy do wstrzyknięcia


Po dokładnym wymieszaniu roztwór HEPCLUDEX® powinien być klarowny.

Uwaga! Po całkowitym rozpuszczeniu HEPCLUDEX® powinien być klarowny i pozbawiony piany.

Jeśli roztwór HEPCLUDEX® wydaje się spieniony lub ma żółtawe zabarwienie, należy dłużej poczekać na jego rozpuszczenie.

W przypadku zauważenia pęcherzyków powietrza należy delikatnie postukać w ściankę fiolki, aż znikną. Jeśli po (całkowitym) rozpuszczeniu w roztworze HEPCLUDEX® nadal widać jakiegokolwiek cząstki, to ta fiolka nie może być użyta. Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, który dostarczył lek.

Zrekonstruowany bulewirytod musi być natychmiast zużyty.




2F

Czyszczenie fiolki


Ponownie oczyścić górę fiolki HEPCLUDEX® nowym wacikiem nasączonym alkoholem.

Pozostawić do wyschnięcia na powietrzu.



3A
Wprowadzenie igły do fiołki


Wziąć do ręki strzykawkę.
Wprowadzić igłę do fiołki z płynnym HEPCLUDEX®.



3B
Pobranie HEPCLUDEX®


Delikatnie obrócić fiołkę do góry dnem. Upewnić się, że końcówka igły cały czas znajduje się pod powierzchnią roztworu HEPCLUDEX®, aby zapobiec przedostawaniu się do strzykawki pęcherzyków powietrza.

Powoli odciągnąć tłok, aby pobrać do strzykawki 1,0 ml HEPCLUDEX®.



3C
Zakończenie przygotowywania


Delikatnie postukać lub popstrykać strzykawkę i wcisnąć/odciągnąć tłok, aby usunąć zbędne powietrze i pęcherzyki. Aby upewnić się, że do strzykawki pobrany został 1,0 ml HEPCLUDEX®, może być konieczne odciągnięcie tłoka za kreskę wskazującą 1,0 ml. Ostrożnie wyjąć igłę i strzykawkę z fiołki.



3D
Wymiana i usunięcie igły

Zdjąć dłuższą igłę ze strzykawki i usunąć ją w bezpieczny sposób, tak aby nie stanowiła zagrożenia.

Uwaga! Nie należy nakładać plastikowej osłonki z powrotem na igłę.




3E
Założenie igły do wstrzyknięć

Założyć krótszą igłę na strzykawkę.

Uwaga! Należy upewnić się, że igła jest dobrze zamocowana, lekko dociskając i jednocześnie obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.


Zdjąć plastikową osłonkę.



3F
Wybór miejsca wstrzyknięcia


Wybrać inne miejsce wstrzyknięcia niż to, w które poprzednio wstrzyknięto lek. Oczyścić miejsce wstrzyknięcia nowym wacikiem nasączonym alkoholem. Zacząć od środka i dociskając, przecierać kolistym ruchem na zewnątrz.

Uwaga! Należy poczekać do wyschnięcia miejsca wstrzyknięcia.



3G
Przygotowanie miejsca wstrzyknięcia

Uchwycić i przytrzymać palcami fałd skóry wokół miejsca wstrzyknięcia.



3H
Wstrzyknięcie HEPCLUDEX®

Wbić igłę w skórę pod kątem 45 stopni. Igła powinna zostać wprowadzona prawie na całą długość.

Powoli wciskać tłok aż do końca, aby wstrzyknąć HEPCLUDEX®. Wyjąć igłę ze skóry.

Zdjąć igłę ze strzykawki i usunąć razem ze strzykawką w bezpieczny sposób, tak aby nie stanowiły zagrożenia (patrz 3D).