



HEPCLUDEX®

Bulevirtid 2mg


Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung



RUM

Instrucțiuni de injectare

AT-HPX-0078; 09/2023



Gilead Sciences GesmbH
Wagramer Straße 19
1220 Wien



GILEAD

Creating Possible

Instrucțiuni de injectare, pas cu pas

Aceste instrucțiuni de injectare sunt concepute pentru pacientele și pacienții cărora li s-a prescris deja HEPCLUDEX®. Acestea nu înlocuiesc informațiile de utilizare, ci urmăresc să vă ajute să vă puteți injecta medicamentul zilnic în condiții de siguranță. Vă rugăm să citiți întotdeauna suplimentar informațiile de utilizare/prospectul cu atenție.


Înainte de a începe tratamentul acasă cu acest medicament, medicul dumneavoastră sau personalul medical de specialitate vă va arăta cum trebuie să preparați și să injectați HEPCLUDEX®. Aceste instrucțiuni vă arată cum să vă injectați medicamentul singur(ă). Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu personalul medical de specialitate dacă aveți neclarități sau întrebări, sau dacă aveți nevoie de informații suplimentare sau de ajutor. Acordați-vă timp pentru a prepara și a vă administra cu atenție HEPCLUDEX®.

Locuri de injectare



Pentru a reduce reacțiile la locul injectării, puteți schimba periodic locul de injectare cu HEPCLUDEX®.

În următoarele zone **nu este permisă injectarea** HEPCLUDEX®: Genunchi, zona inghinală, partea inferioară sau interioară a feselor, direct într-un vas de sânge, în jurul ombilicului, pe un țesut cicatricial, o echimoză, o aluniță, o cicatrice chirurgicală, un tatuaj, un loc al unei arsuri sau oriunde există deja o reacție la injectare.

Burtă




Coapsă



1A

Păstrarea


Flacoanele HEPCLUDEX® trebuie păstrate în ambalajul original în frigider (2°C până la 8°C), pentru a proteja HEPCLUDEX® împotriva luminii.



1B

Prepararea dozelor


Următoarele instrucțiuni sunt valabile pentru dizolvarea unei singure doze.



1C

Spălarea mâinilor

Spălați-vă mâinile temeinic cu săpun și apă caldă și uscați-le cu un prosop curat. De îndată ce mâinile dumneavoastră sunt curate, **nu mai atingeți** alte obiecte în afara medicamentului, accesoriilor și zonei din jurul locului de injectare.




1D

Curățarea flaconului

Ștergeți partea superioară a flaconului cu un tampon nou cu alcool și lăsați-o să se usuce la aer.

Dacă atingeți partea superioară a dopului de cauciuc după curățare, curățați-o din nou cu un tampon nou cu alcool.



2A

Extragerea de apă sterilă

Luați seringă în mână. Atașați acul mai lung.


Important! Asigurați-vă că acul prevăzută cu capac de protecție este bine fixat, împingându-l ușor în jos în timp ce îl rotiți în sensul acelor de ceasornic.

Scoateți capacul de protecție din plastic, deschideți apa sterilă pentru preparate injectabile. Introduceți acul în flacon și întoarceți ușor flaconul cu apă cu capul în jos. Asigurați-vă că vârful

acului se află întotdeauna sub suprafața apei, pentru a preveni pătrunderea bulelor de aer în seringă.

Trageți încet înapoi pistonul seringii pentru a introduce 1 ml de apă sterilă în seringă.

Scoateți cu atenție seringă cu acul din flacon.




2B

Injectarea apei sterile în pulbere

Bateți cu atenție în flaconul HEPCLUDEX® pentru a afâna pulberea.

Introduceți acul seringii cu apă sterilă înclinat în flaconul HEPCLUDEX®.

Injectați încet apa sterilă, astfel încât să picure pe peretele flaconului în pulberea HEPCLUDEX®.




2C

Amestecarea cu atenție a HEPCLUDEX®

Bateți ușor timp de 10 secunde în flaconul HEPCLUDEX® pentru ca pulberea să înceapă să se dizolve. Apoi, rulați încet flaconul HEPCLUDEX® între palme, pentru a vă asigura că este bine amestecat conținutul. Asigurați-vă că nu rămâne pulbere HEPCLUDEX® prinsă pe pereții flaconului.

Important! Nu scuturați flaconul HEPCLUDEX®. Dacă îl scuturați, medicamentul formează spumă și durează semnificativ mai mult până când medicamentul se dizolvă.




2D

Verificarea HEPCLUDEX®

De îndată ce pulberea începe să se dizolve, așezați flaconul deoparte; se va dizolva complet.

După ce loviți ușor cu degetele în flacon, dizolvarea poate să dureze până la 3 minute.



2E

HEPCLUDEX® pregătit pentru injectare


După amestecarea completă, soluția HEPCLUDEX® trebuie să fie limpede.

Important! HEPCLUDEX® complet dizolvat trebuie să fie limpede și să nu prezinte spumă. Dacă soluția HEPCLUDEX® prezintă spumă sau are un aspect gălbui, mai așteptați puțin până când pulberea s-a dizolvat complet.

Dacă vedeți bule de aer, loviți ușor în flacon, până când dispar bulele de aer.

Dacă vedeți particule în soluția HEPCLUDEX® după ce pulberea s-a dizolvat (complet), nu folosiți flaconul respectiv. Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului care vi l-a furnizat.

Bulevirtida reconstituită trebuie administrată imediat.




2F

Curățarea flaconului

Curățați din nou partea superioară a flaconului HEPCLUDEX®, utilizând un tampon nou cu alcool.

Lăsați să se usuce la aer.




3A

Introducerea acului în flacon

Luați seringă în mână.

Introduceți acul în flaconul cu HEPCLUDEX® lichid.




3B

Extragerea HEPCLUDEX®

Întoarceți ușor flaconul cu capul în jos. Asigurați-vă că vârful acului rămâne permanent sub suprafața soluției de HEPCLUDEX®, pentru a preveni pătrunderea bulelor de aer în seringă.


Trageți încet pistonul seringii, pentru a extrage 1 ml HEPCLUDEX®.



3C

Finalizarea preparării

Bateți ușor sau loviți seringă și împingeți în jos respectiv trageți pistonul înapoi, pentru a elimina aerul excesiv și bulele de aer. Pentru a vă asigura că în final în seringă se află 1 ml HEPCLUDEX®, în anumite circumstanțe trebuie să trageți înapoi pistonul seringii dincolo de marcajul de 1 ml. Scoateți cu atenție seringă cu acul din flacon.




3D

Schimbarea acului și eliminarea acului vechi

Îndepărtați acul mai lung de pe seringă și eliminați-l în mod corespunzător în recipientul pentru ac furnizat, astfel încât nimeni să nu se poată răni.

Important! Nu așezați la loc capacul de protecție din plastic.




3E

Atașarea acului pentru injectare

Atașați acul mai scurt la seringă.

Important! Asigurați-vă că acul prevăzut cu capac de protecție este bine fixat, împingându-l ușor în jos în timp ce îl rotiți în sensul acelor de ceasornic.

Scoateți capacul de protecție din plastic.




3F

Alegerea locului de injectare

Alegeți un alt loc de injectare decât cel pe care l-ați folosit la ultima injecție. Curățați locul de injectare cu un tampon nou cu alcool. Începeți din centru, aplicați presiune și curățați cu o mișcare circulară de la interior spre exterior.


Important! Lăsați locul de injectare să se usuce la aer.



3G

Pregătirea locului de injectare

Prindeți pielea din jurul locului de injectare într-un pli de piele și țineți fixat pliul în această poziție.



3H

Injectarea HEPCLUDEX®

Împungeți acul în piele într-un unghi de 45 grade. Acul trebuie să fie introdus aproape complet.

Apăsăți pistonul seringii complet în jos, pentru a injecta HEPCLUDEX®.

Scoateți acul din piele.

Îndepărtați acul de pe seringă și eliminați acul și seringă în mod corespunzător în recipientul pentru ac furnizat, astfel încât nimeni să nu se poată răni (consultați 3D)