MEINE THERAPIE MIT BIKTARVY®

HINWEIS:

Nur zur Abgabe an Patienten/Patientinnen, denen BIKTARVY® verordnet wurde.

GILEAD

Hinweise zu Ihrer Therapie mit BIKTARVY®

Ihr Arzt hat Ihnen BIKTARVY® verschrieben.

Ein antiretrovirales Medikament, das zur Behandlung des humanen Immundefizienzvirus 1 (HIV-1) bei Erwachsenen entwickelt wurde und für die Erstbehandlung Ihrer Infektion oder als Alternative zu einer bisherigen Therapie eingesetzt wird.

Die in diesem Arzneimittel enthaltenen Wirkstoffe hindern das HI-Virus daran sich zu vermehren und verringern somit die Virus-Konzentration in Ihrem Körper. Dadurch wird das Immunsystem gestärkt und das Risiko für die Entwicklung von Erkrankungen, die mit der HIV-Infektion in Zusammenhang stehen, gesenkt.

Auf den folgenden Seiten finden Sie die wichtigsten Informationen im Überblick. Bitte lesen Sie die BIKTARVY® Packungsbeilage/Gebrauchsinformation trotzdem sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme des Arzneimittels starten, denn sie enthält wichtige Informationen.

Sollten Fragen zur Therapie mit BIKTARVY® auftauchen, wenden Sie sich bitte an Ihren behandelnden Arzt oder Apotheker.

Wie sieht BIKTARVY® aus?



BIKTARVY® enthält drei Wirkstoffe pro Tablette:



Originalgröße
ca. 15 mm x 8 mm

- 50 mg Bictegravir
- 200 mg Emtricitabin
- 25 mg Tenofoviralafenamid


Aufbewahrung

BIKTARVY® soll in der Originalverpackung aufbewahrt werden, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen. Es ist wichtig, dass die Flasche fest verschlossen bleibt und das Arzneimittel außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird.

Die richtige Einnahme von BIKTARVY®

Wie muss ich dieses Arzneimittel einnehmen?

Die übliche Dosis ist eine Tablette einmal täglich unabhängig von einer Mahlzeit. Die Filmtablette darf nicht zerkaut, zerkleinert oder geteilt werden, da dies die Art, wie das Arzneimittel in Ihrem Körper freigesetzt wird, verändern könnte.



1 x täglich



Einnahme zu jeder Tageszeit möglich



Unabhängig von den Mahlzeiten

Was muss ich beachten, wenn ich die Einnahme vergessen habe?

Innerhalb von 18 Stunden nach der gewohnten Einnahmezeit:

Holen Sie die Einnahme so bald wie möglich nach. Die nächste Tablette nehmen Sie dann wieder wie gewohnt zum üblichen Zeitpunkt ein.

Nach mehr als 18 Stunden nach der gewohnten Einnahmezeit:

Holen Sie die versäumte Dosis nicht mehr nach. Am nächsten Tag können Sie mit der Einnahme zur gewohnten Zeit fortfahren.



Was ist bei Erbrechen zu beachten?

Wenn Sie sich weniger als 1 Stunde nach der Einnahme von BIKTARVY® übergeben haben, nehmen Sie eine weitere Tablette ein. Ansonsten brauchen Sie bis zur gewohnten Zeit am nächsten Tag keine weitere Tablette einnehmen.



Warum ist eine regelmäßige Einnahme so wichtig?

Für den Erfolg Ihrer Therapie mit BIKTARVY® ist eine regelmäßige und tägliche Einnahme entscheidend. Sobald die Einnahme ausgesetzt wird, sinkt die Wirkstoffkonzentration im Körper und das Virus kann sich wieder vermehren. Dabei können fehlerhafte Viruskopien entstehen, die durch antiretrovirale Medikamente nicht mehr bekämpft werden können und sich trotz Behandlung weiter vermehren. Folglich kann eine Resistenz entstehen, die sich negativ auf Ihren Therapieerfolg auswirkt.

Bitte denken Sie daher 1 x täglich an Ihre BIKTARVY® Tabletteneinnahme.

Was muss ich bei der Einnahme mit anderen Arzneimitteln/Nahrungsergänzungsmitteln beachten?

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben. Dazu gehören auch frei verkäufliche Magenmittel, Nahrungsergänzungsmittel (z. B. Multivitamintabletten) und pflanzliche Arzneimittel.

Wird das Risiko, andere Menschen mit HIV zu infizieren, vermindert?



Mit BIKTARVY® kann das HI-Virus erfolgreich zurückgedrängt werden. Eine Heilung ist derzeit jedoch nicht möglich. Obwohl es sich gezeigt hat, dass die erfolgreiche Virussuppression durch eine antiretrovirale Therapie das Risiko einer sexuellen Übertragung erheblich reduziert, kann ein Restrisiko nicht ausgeschlossen werden. Bitte halten Sie sich deshalb an die Regeln, um eine Übertragung von HIV zu verhindern z.B. durch Safer Sex.



Reisen mit BIKTARVY®



Was muss ich bei einer Reise beachten?

Diese kleine Checkliste soll Ihnen bei der Vorbereitung Ihrer Reise helfen.

- ☑ **Reserven prüfen**
  Reichen die Tabletten noch für die gesamte Reisezeit? Falls nicht: rechtzeitig Rezept besorgen.
- ☑ **Medikament ins Handgepäck**
  So wird das Risiko minimiert, dass man beim Verlust eines Gepäckstücks am Ziel ohne Arzneimittel dasteht.
- ☑ **Englischsprachige Bescheinigung vom Arzt holen**
  Falls es bei der Einreise zu Fragen kommt, kann die Arzt-Bestätigung beim Zoll vorgewiesen werden.
- ☑ **Zeitverschiebung**
  Eine Zeitverschiebung ist in der Regel kein Problem. Wenn Sie BIKTARVY® z.B. immer morgens einnehmen, so können Sie dies auch am Zielort machen. Sprechen Sie zur Sicherheit nochmal mit Ihrem behandelnden Arzt oder Ihrem medizinischem Betreuungsteam.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in der Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen

Traisengasse 5, 1200 Wien
Österreich

Fax: +43 (0) 50 555 36207
Website: http://www.basg.gv.at

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Meine Notizen

Meine Notizen

Meine Notizen

Weitere Infos

HIV heute: WEITER NACH VORNE BLICKEN!

www.HIVheute.at

Viele interessante Fakten, Hintergründe und Hilfestellungen rund um das Thema HIV finden Sie auch online unter **www.hivheute.at**





Gilead Sciences GesmbH
Wagramer Straße 19, 1220 Wien
Erstellt: November 2018, BIK/AT/18-11//1235